

6 MARS 2020

JOURNÉE INTERNATIONALE DU LYMPHŒDÈME

LES 6 POINTS À SAVOIR

Cette pathologie chronique est due à un dysfonctionnement du système lymphatique. À l'origine d'œdèmes importants, elle touche surtout les femmes. Bien qu'elle puisse apparaître dès la naissance (lymphœdème primaire), elle concerne davantage les patientes ayant été traitées pour le cancer (lymphœdème secondaire). Encore méconnue en France, cette maladie rend la vie quotidienne très difficile pour les patientes.

250 000

C'est le nombre de personnes atteintes d'un lymphœdème secondaire en France*.

Environ **1 FEMME SUR 5** développe un lymphœdème après un cancer du sein.

Gillespie, 2017

Les risques de développer un lymphœdème suite à un cancer varient entre **10 ET 50 %** selon le type de cancer et d'interventions subies.

Larouche, 2011

Un lymphœdème peut survenir dans les **5 ANS** suivant un traitement et dans les **15 ANS** après une mastectomie.

Fondation contre le cancer

L'œdème touche principalement **3 ZONES DU CORPS** : les membres inférieurs (jambes, pieds), les membres supérieurs (bras, mains) et l'abdomen.

IL N'EXISTE PAS DE TRAITEMENT CURATIF, mais un accompagnement thérapeutique basé entre autres sur le bandage et la contention, le drainage lymphatique manuel et les soins de peau pour réduire et contenir l'œdème.



*Prevalence of cancer : Les cancers en France, Institut national du cancer, édition 2014.
Prevalence of lymphedema : Recent progress in the treatment and prevention of cancer-related lymphedema, CA Cancer J Clin, 2015.